



Longicorneos (col.) do Brasil, novos ou  
pouco conhecidos  
por  
JULIUS MELZER

**Cerambycinae.**

*Eburodacrys amazonica*, n. sp.

Nitida, laete rufo-testacea, pilis brevibus testaceis sparsim hirta, setis longissimis et erectis in elytris subseriatim dispositis intermixtis; caput grosse punctat rugosum; antennae ♂ corpore sesqui ♀ leniter longiores, subtus fimbriatae, scapo brevi, subclavato, punctat rugoso, basi sulcato, art. 3-5 fortiter sulcatis; thorax latitudine haud longior, antice posticeque paulo coarctatus, dorso rugis punctisque intricatis dense, profunde regulariter striatus, antice tuberculis duobus nigris nitidis munitus, callo elongato, obsoleto, in medio, lateribus tuberculo parvo, conico, acuto ante medium, rufo-testaceo utrinque armatis; scutellum subquadratum, apice rotundatum; elytra basi sat dense et grosse punctata, punctis apicem versum sensim oblitteratis, apice quadrispinosa, spinis externis mediocribus, suturalibus minutis, rufo-testaceis, guttisque tribus eburneis, una basali, oblonga, macula nigra\* terminata, duabus submedianis, contiguis, externa sat longiore, internam antice posticeque superante, antice posticeque nigro terminantis singula-

tum ornata; femora laevia, apice nigra, media et postica intus valde nigro-spinosa; mesosterni processus inter coxas sat latus, deplanatus, postice incisus; metasternum sat dense punctulatum, abdomen sublaeve.

Long. 21-33 mm., lat. 5 1/4-8 1/2 mm.

Hab. Mujo e Santarem, Estado do Par .

Esta especie que me parece nova para a sciencia, tem muitas afinidades com *E. callixantha*, Bates, conhecida de Chontales, bem como da Venezuela e do Mexico, e se parece igualmente com *E. laevicornis*, do mesmo autor e avisado do Panam  e da Venezuela.

A disposi o das manchas c r de marfim dos elytros, nesta especie nova,   semelhante a de *E. callixantha*, as pernas por m s o sensivelmente mais curtas e os femoras s o pretos na ponta. *E. callixantha*, al m disto, em tamanho,   muito menor.

Da *E. laevicornis*, esta especie se afasta pelos sulcos bem fundos nos articulos 3' at  5 das antenas, que tambem na   assim est o formados; pela forma o do scapo, etc., querendo me parecer esta especie nova bem caracterisada.

*Stizocera boyi*, n. sp.

♂. Nitida, elongata, setis nigris in elytris lineatim ordinatis sparsim hirta, capite, prothorace, scutello; mesosterno coxisque anticis et mediis rubro-rufis, elytris cyaneo-viridis, antennis, pedibus, metasterno abdomineque nigris; caput vix punctulatum, vertice basi dense punctato; antennae corpore plus dimidio longiores, subtilissime griseo villosae, subtus laxe longe fimbriatae, scapo subclavato, supra basi sulco longitudinaliter impresso, art. 3-5 sulcatis, art. 3-6 valde spinosis; thorax latitudine longior, basi coarctatus et sulcatus, dorso obsolete quinque gibber, rugis undulatis transversim striatus, lateraliter autem subtus punctatus; scutellum rotundatum, subtilissime punctulato-coriaceum; elytra basi punctis su-

bordinatis dense cribata, postice sublaevia, apice truncata, angulo externo valde spinoso, suturali brevissime dentato; femora fortiter clavata, intermedia et postica valde bispinosa, spinis subaequalibus; prosterni processus modice angustus et arcuatus, mesosterni processus tuberculatus; acetabula media extus clausa; metasternum abdomenque nitida vix punctata.

Long. 14 1/4 mm.

Hab. São Paulo de Olivença, Estado de Amazonas, H. C. Boy, leg. a quem com prazer dedico esta especie.

Esta especie mostra certas afinidades com *S. rutilus* Bates, avisada de Nicaragua, mas, na coloração, parece-se muito com *Castiale elegantula*, Perr.

*Ommata anceps*, n. sp.

Gracilis, subopaca, nigra, capite, thorace, elytris que rufo-testaceis, ♂ antennarum art. 9 apice 10 toto, ♀ 9 toto 10 basi, ♂ tarsorum posticorum art. 1.<sup>o</sup> et 2.<sup>o</sup> (3) albidis, subtus sat dense griseo-hirta; caput glabrum, rostro brevi, fronte subtiliter sulcata, nitida, sparsim punctulata, ♂ oculis antice modice ♀ sat distantibus vertice crebre punctulato; antennae apicem elytrorum superantes, subtus basi laxe ciliatae, art. 3-6 linearibus, 7-10 leniter incrassatis, haud serratis; thorax latitudine longior, subcylindricus, basi paululum constrictus, crebre punctulatus, setis tenuissimis rufo-flavis sparsim hirtus; scutellum minutum, rufo-flavo hirtum; elytra abdominis apicem attingentia, post homeros modice attenuata dein subaeque lata, apice singulatim oblongo-ovalia, dorso plana, crebre punctulata pilisque rufo-flavis hirsuta, marginibus suturalibus vix dehiscentibus; femora subgracilia, modice clavata, postica elongata, abdominis apicem superantia; tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis paululum longiore.

♂ long. 7-8 mm., ♀ 8 mm.

Hab. 3 ♂ de Passa Quatro, Sul de Minas, J. F.

Zikán leg. 1 ♀ de Joinville, Estado de Santa Catharina, C. Schmith leg.

Pela separação bem sensível dos olhos na fronte, esta especie se afasta um tanto deste genero, creio, porém, que mesmo assim, deve a elle ser juntado.

A coloração é bem semelhante a de *Chariegus signaticornis* Lucas longicorneo, que igualmente se encontra em Passa Quatro.

O Snr. Zikán avisou-me que encontrou este interessante cerambycideo sobre flôres duma especie de *Croton*, talvez do *Croton floribundus* M., Euphorbiacea, que se encontra entre outros, nos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo e Paraná.

*Ommata (Eclipta) vicina* n. sp.

♂. Gracilis, subopaca, nigra, antennarum art. 6-11 basi, femoribus anticis subtus, mediis et posticis basi elytrorumque vittis duabus angustis rufo-testaceis, sparsim albido hirsuta; caput passim punctulatum, vertice crebre punctulato-coriaceo, rostro subbrevis, oculis magnis, in fronte fere contiguus; antennae apicem elytrorum superantes, art. 3-6 sublinearibus, 7-11 modice incrassatis, intus subserratis; thorax latitudine longior, subcylindricus, basi paululum constrictus, crebre reticulato-punctulatus, supra sulcis duobus obsoletis longitudinaliter impressus; scutellum minutum, subtilissime coriaceum et albido-pubescens; elytra abdominis segmenti secundi apicem haud attingentia, basi thorace paulo latiora, postice sensim attenuata, post humeros ad apicem leniter incurvata, apice ipso sinuatim truncato in singulis, angulis vix productis, a medio suturae ad apicem arcuatim dehiscencia, dorso plana sat dense punctata; femora quatuor antica subabrupte, postica sensim clavata, haec elongata, abdominis apicem haud attingentia; metasternum abdomenque subtiliter punctulata et argenteo-sericea.

Long. 4 3/4-6 1/2 mm. 10 ex.

♀. Oculorum lobis inferiores distantes; thorax rufus, antennarum art. 7-11 sensim incrassatis.

Long. 5 1/2-6 1/2 mm. 3 ex.

Hab. Passa Quatro, Sul de Minas, E. Jaeger leg.

A manchinha clara em cada elytro não é transparente e bastante densamente punctuada, motivo que me faz reunir esta especie ao genero *Ommata*.

Esta especie deve ter muitas affinidades com *Ommata brachialis* Bates, que infelizmente até hoje não tive a occasião de estudar, differe porém na punctuação, na côr e além disto os elytros na especie de Bates sobrepassam a base do penultimo segmento abdominal, não chegando os mesmos na especie nova a borda posterior do segundo segmento.

*Odontocera Zikani*, n. sp.

♀. Nigra, subtiliter flavo-aureo villosa, antennarum art. 4-11 (10), femoribus, — mediis est posticis clava nigra excepta, — tibiis (tibiis anticis plus minusve infuscatis), tarsorum art. 1 et 2 abdominisque segmento basali toto sequente plus minusve melleo-flavis, elytris vitreis, nigro marginatis: caput in modum rostri breviter productum, nitidum, vertice subopaco, fronte passim punctata et longitudinaliter sulcata, vertice scabroso punctato, oculorum lobis inferioribus modice distantibus; antennae dimidium elytrorum modice superantes, basi subtus laxe ciliatae, scapo passim punctato, art. 3-5 linearibus 6-11 sensim incrassatis; thorax latitudine longior, subovato-cylindricus, basi paulo constrictus et transversim sulcatus, crebre, grosse reticulato-punctatus; scutellum flavo-aureo pubescens; elytra abdominis segmentum penultimum parum superantia, basi thorace latiora, lateraliter post humeros ad apicem leniter incurvata, apice ipso subrecte truncato in singulis, angulis haud productis, dorso plana a medio ad extremitatem paulo dehiscentia, disco vitreo, pallide flavo, nitidissimo.

disperse punctulata, marginibus externis sat late et suturalibus anguste nigro vittatis, crebre punctatis; femora quatuor antica abrupte postica sensim clavata, háec elongata, abdominis segmentum quartum superantia; tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis longiore; mesosternum dense flavo-aureo tomentosum; metasternum passim punctulatum, pilis flavo-aureis hirtum, episternis flavo-aureo pubescentibus; abdomen nitidum, fere glabrum.

Long. 10 1/2-12 mm.

Hab. 1 ex. de Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, 1 ex. do Itatiaya, Estado do Rio de Janeiro, numa altura de 700 metros. J. F. Zikán leg.

*Lygrocharis*, n. gen.

Caput antice in modum rostri haud productum, inter antenas concavum, oculis minute granulatis, profunde excisis, lobis superioribus inter se valde distantibus, lobis inferioribus magnis, in fronte magis distantibus; antennae abdominis apicem haud attingentes, 11 articulatae, scapo brevi, obconico, art. 3-6 linearibus, 7-11 sensim incrassatis, 3 elongato, 4 praecedente et sequente brevioribus; thorax latitudine maxima vix dimidio longior, oblongo-ovalis, basi modice constrictus, antice quam postice paululum angustior, margine antico recte truncato; scutellum transversum, apice rotundatum; elytra basi thoracis latitudinem maximam fere aequantia, abdominis segmentum tertium parum superantia, ad apicem sensim attenuata, lateribus arcuatim constrictis, apice ipso oblongo-ovalia, dorso plana, a medio suturae ad extremitatem dehiscentia; femora valde clavata, media et postica elongata, haec abdominis extremitatem parum superantia; tibiae posticae elongatae, graciles; tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis subaequali, ♂ art. 1.<sup>o</sup> et 2.<sup>o</sup> valde incrassatis, ♀ simplices; coxae anticae globosae; acetabula antica postice clausa, inter-

media extus hiantia; prosterni processus angustus, mesosterni processus plus duplo latior, postice emarginatus; abdomen subcylindricum.

Este genero deve juntar-se ao grupo *Rhinotragini* e por causa dos olhos que tambem no ♂, na sua parte inferior, quasi são inteiramente lateraes, aproxima-se ao genero *Stenopseustes*.

*Lygrocharis neivai* n. sp.

Rubro-rufus, elytris pedibusque pallidioribus, antennarum art. 8 (9) -11 plus minusve infuscatis, subtiliter sparsim griseo-sericeo villosus, sensusque longioribus et erectis passim intermixtis; caput nitidum, punctatum, vertice crebre punctulato, fronte leniter sulcata; antennae subtus laxe ciliatae, scapo passim punctulato, art. 1-5 nitidis, 6-11 opacis, ♂ art., 7-11 sensim incrassatis, ♀ valde inflatis; thorax subopacus, setis rufis et erectis passim hirtus, sat dense punctatus, media plaga minuta longitudinali et irregulari laevi, lateribus subtiliter argenteo-sericeis; scutellum argenteo-sericeum; elytra subopaca, subtiliter punctulata, pilis minutis argenteo-sericeis leviter obnubilata, basi setis rufis et erectis passim intermixtis; pedes nitidi, tibiae graciles, pilis subtilibus parce hirtae; corpus subtus sparsim punctulatum pilisque argenteo-sericeis, -densioribus in lateribus, — indutum; abdomen nitidum, segmentis 1-4 lateraliter argenteo-sericeo pubescentibus.

Long. 6-10 mm. 7 ♂ e 3 ♀.

Hab. 8 ex. do Bosque da Saude perto da Capital do Estado de São Paulo, colleccionados pelo autor, 2 ♀ da Fazendinha perto do Rio Negro, Estado de Paraná, collegio dos Franciscanos leg.

Os ultimos quatro articulos das antennas das ♀ são muito mais dilatado e grossos que os dos ♂.

Dedico esta especie ao illustre director do Museu nacional do Rio de Janeiro e celebre sabio Dr. Arthur Neiva.



*Paromoeocerus notabilis* Metz.

Rev. Mus. Paul. 1918, t. X p. 13

Fazendo a descrição desta espécie estavam apenas a minha disposição 2 ♂ e 1 ♀. Desde então fui mais feliz recebendo material procedente de São Bento, de Rio Negrinho, de Joinville, do Estado de Santa Catharina bém como de São Bernardo do Estado de São Paulo.

Assim me foi dado verificar que a ♀ descripta como pertencente a esta espécie não é a de *P. notabilis* mas sim de outra espécie da qual mais além apresentarei a descrição.

Da verdadeira ♀ de *P. notabilis* agora posso juntar os dados seguintes:

*P. notabilis*, ♀. Nigra, antennis, pedibus, coxis, palpis labroque rufis vel testaceo-rufis, elytris violaceis, nitidissimis; fronte sulcata et sparsim punctata, vertice sat dense punctulato; antennae plus quam duobus articulis apicem elytrorum superantes, art. 6 scopa magna nigra ornato; thorax latitudine maxima perparum longior, basi et apice constrictus, lateribus paulo ante medium utrinque obtuse angulato-dilatatis, supra subplanus, nitidissimus, subtiliter sparsim punctatus, obtuse 4-tuberculatus, subtus leniter transversim rugosus et subtiliter rufo-pubescentis; scutellum rufo-pubescentis; elytra nitidissima, subtilissime sparsim punctata, setis nonnullis nigris lineatim ordinatis hirta, apice conjunctim rotundata, angulis suturalibus haud acutis; femora leniter clavata, postica apice elytrorum haud superantibus; sterna subtiliter flavo pubescentia, metasterno in medio glabro, lateraliter creberrime punctulato; abdomen segmentis 5 compositum, ano setis rufis antrorsum arcuatis oblecto.

Long. 12-16 1/2 mm.

*Paromoeocerus scabricollis* n. sp.

♂. Niger, antennis, pedibus, coxis, palpis labroque testaceo-rufis, elytris violaceis, nitidissimis; caput

porrectum, confertim punctatum, inter antenas sulcatum et leviter concavum; antennae corpore sesqui longiores, subtiliter villosae, subtus laxe ciliatae, s, capo obconico, sat dense punctulato, art. 4. praecedente brevior sequente aequale, 6 scopa magna nigra ornato, thorax latitudine maxima perparum longior, basi et apice constrictus lateribus paulo ante medium utrinque obtuse angulato-dilatatis, supra subplanus, obtuse 4-tuberculatus, confertim punctatus, linea media longitudinali laevi, subtus transversim rugosus; scutellum subtiliter rufo pubescens; elytra nitidissima, subtilissime sparsim punctata, setis nonnullis nigris lineatim ordinatis hirta, apice conjunctim rotundata, angulis suturalibus haud acutis, femora leniter clavata, postica apice elytrorum attingentibus; sterna subtiliter flavo-pubescentia, metasterno in medio glabro, lateraliter punctulato-coriaceo; abdomen nitidum, pilis nonnullis rufis hirtum, segmentis 6 composito, segmento ultimo brevi, apice emarginato.

Long. 11 1/2-15 mm.

♀. Antennae plus quam duobus articulis apicem elytrorum superantes! abdomen segmentis 5 compositum, ano setis rufis antrorsum arcuatis obtecto.

Long. 11 1/2-16 3/4 mm.

Hab. Joinville, Estado de Santa Catharina, São Bernardo, Estado de São Paulo.

*Compsocerus Chevrolati*, Goun.

Bull. Soc. Et. Fr. 1910, p. 141, 142.

Desde que tratei desta especie na Revista do Museu Paulista, 1920, Vol. XII, p. 18, pude estudar dois ♂ deste longicorneo, que é um tanto raro. Um delles foi colleccionado em São Bento, Estado de Santa Catharina, o outro recebi-o do collegio dos Franciscanos de Rio Negro, Estado de Paraná.

Conforme Gounelle avisa, as antenas dos ♂ são

12-articuladas, porém, estes dois exemplares tiveram as antenas munidas somente de 11 articulos e assim, si o Snr. Gounelle não se enganou, temos aqui mais um caso bem singular e interessante de existirem da mesma especie ♂ com antenas de differente numero de articulos.

*Neoclytus bruchi* n. sp.

Brunneo-fuscus, pedibus humerisque rufo-testaceis, fronte vittis duabus, fascia in vertice, torace fasciis, duabus anticis vittisque quatuor basalibus, scutello, elytris ad humeros et fasciis tribus, pectore abdomineque fere omnino sulfureo-tomentosis; caput crebre punctulatum, fronte sulcata, sulco nigro, utrinque sulfureo-vittata, vertice fascia sub oculos continuata sulfurea; antennae elytrorum trientem basalem haud attingentes, 10-articulatae, scapo gracili, crebre punctulato, art. 3.<sup>o</sup> scapo longiore, art. 5-10 valde incrassatis; thorax subglobosus, prope-basim constrictus, supra carina media lata asperata longitudinaliter instructus, fasciis duabus angustis, medio interruptis, propter marginem anticam et in medio disci vittisque quatuor basalibus, antice abbreviatis sulfureis ornatus, infra dense sulfurco tomentosus; scutellum triangulare apice rotundatum, dense sulfureo-tomentosum; elytra basi thoracis latitudinem maximam aequantia, elongata, parallela, postice rotundata, apice obliquiter truncato, angulis inermibus, dorso convexa, subtilissime punctato-coriacea, macula triangula utrinque ad humeros, fasciisque tribus sulfureo-tomentosis ornata, prima obliqua pone scutellum incipiente et versus quartam partem longitudinis ad marginem lateralem directa, secunda subrecta post media, tertia recta ante apicem; femora modice clavata, postica abdominis apicem haud superantia; abdomen segmentis 1-4 apice late sulfureo marginatis.

Long. 8 1/4-12 1/2 mm.



Hab. Capital do Estado de São Paulo colleccionado pelo autor, Alto da Serra, R. Spitz leg., Fazendinha, perto de Rio Negro, Estado de Paraná, Collegio dos Franciscanos leg.

Esta especie na coloração mostra muitas affinidades com *N. delicatus* Goun. e *N. vitticollis* Auriv., a segunda e terceira faixa dos elytros nesta nova especie porém são quasi recta e distinguem-n'a assim sem difficuldade.

A coloração de *E. pronoto* de *N. vitticollis* se aproxima um tanto da de *N. bruchi*, as pernas e particularmente as posteriores neste são muito mais curtas que naquelle.

*N. bruchi* mais se parece ainda com *N. delicatus*, a coloração do pronoto e as faixas dos elytros permitem de distinguir facilmente as duas especies.

Dedico esta especie nova ao meu particular amigo, o celebre sabio e mestre de entomologia argentina, Snr. Carlos Bruch.

*Dendrobias vagus* n. sp.

Elongatus, nitidus, glaber, brunneo-niger vel castaneus, elytris media fascia albo-testacea, ♂ antennarum art. 3-5 basi ♀ art. 5-6 basi, femoribus basi, tibiis tarsisque rufo-testaceis, metasterno abdomineque ferrugineo-testaceis; caput subtiliter passim punctatum, inter antenas fortiter sulcatum, tuberibus antenniferis intus productis, vertice inter oculos bicarinato, ♂ mandibulae valde productae, horizontales, fortiter arcuatae, spatium magnum transverso-ovatum includentes, apice bidentatis, ♀ breves, subverticales, antennae 11-articulatae, ♂ corpori sesqui longiores, ♀ apicem elytrorum articulis tribus ultimis superantes; scapo clavato, sparsim punctulato, ♂ art. 3-9 intus apice serratis, art. 11 praecedente multo longiore, ♀ art. 7-11 paulo depressis, 3-10 serratis; pronotum ut in *Trachyderes succincto* L. for-

matum, lateraliter tuberibus debilioribus plagisque arcuatis punctatis notatum; prosternum ante coxas haud abrupte declive, subconvexum, sulco medio, transverso sat profundo aratum, depressionibus duabus parvis, subtriangularibus, punctatis notatum; scutellum magnum, triangulare, sparsim punctulatum; elytra glabra, subparallela, apice ipso truncato, angulis inermibus, dorso convexo, sparsim levissime punctulata; prosterni processus postice productus; mesosterni processus gibbosus; coxis metasternoque lateraliter subtiliter albido-villosis; corpus subtus nitidum, subtilissime sparsim punctulatum; pedes breves, femoribus sensim incrassatis.

Long. 13 3/4-17 mm. 3 ♂ 2 ♀.

Hab. Santarém, Estado de Pará.

A ♀ facilmente pode ser tomada como a de *Trachyderes succinatus* L., o exame do prosterno, porém, imediatamente desfaz qualquer duvida. O ♂ pelas mandibulas horizontaes, muito grandes, redondas e somente na ponta munidas de dois dentinhos, não offerece difficuldades.

A formação do prosterno não é exactamente como Dupont' avisa, o sulco é menos profundo e os cantos não são vivos e sim convexos; sendo porém os demais característicos os do genero *Dendrobias* não hesitei de lhe juntar esta especie, que parece ficou desconhecida até hoje.

Evidentemente existem igualmente affinidades com *Charinotus fasciatus*, Dup. mas o pronoto bem como o prosterno têm outra feição *hamisinae*.

#### Lamiinae.

##### *Atrypanus multifasciatus* n. sp.

Fusco-niger, subtiliter griseo-pubescens, fronte, vertice fascia sub oculis continuata, pronoto fasciis tribus, elytris punctis fasciisque utrinque quatuor cinereo-fulvis, thorace utrinque macula magna lateraliter, elytrorum, maculis duabus humeralibus atro-velutinis; caput inter

antennas concavum, fronte plana, longitudinaliter sulcata, genis brevibus, oculis magnis, profunde incis, grosse granulatis, lobis inferioribus elongatis, lobis superioribus fere contiguís; antennae corpore fere duplo longiores, pube cinerea vestitae, subtus setis raris hirtae; thorax lateraliter pone medium angulatus, víx punctatus, dorso fasciis tribus cinereo-fulvis, 1.a subbasali, 2.a media, 3.a marginem anticam aproximata, lateribus maculis magnis atro-velutinis ornatus; scutellum transversum, apice rotundatum, cinereo-tomentosum; elytra oblonga, subdepressa, postice attenuata, apice ipso sinuato-truncato in singulis, angulis laud productis, basi inordinatim punctata, postice sublaevia, pube cinerea vestita, punctis fasciisque quatuor cinereo-fulvis ornata, 1.a ante medium et submarginali, abbreviata, 2.a post medium sat lata, 3.a versus trientem apicalem marginem et suturam attingentibus, 4.a ante apicalem marginem laud attingente, humeris atro-velutinis; femora pedunculata, fortiter clavata, tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup> 2.<sup>o</sup> et 3.a, simul sumptis brevioribus; prosterni processus modice latus, mesosterni processus latus; corpus subtus cinereo-tomentosum, sternis abdominisque lateribus nigro maculatis.

Long. 9 1/4 mm.

Hab. 1 ♀ do Rio Itapemirim, Estado de Espírito Santo. J. F. Zikán leg.

Esta especie effectivamente tem nas antenas alguns cilios e conforme Lacordaire portanto não devé ser annexa a este genero. Creio porém que seu melhor lugar será justamente ahí, pois pelos outros caracteristicos se adapta bem ao mesmo. O ultimo segmento abdominal não é saliente e arredondado posteriormente.

Em especies de outros generos, por exemplo, *Anisopodus* (ao menos em exemplares frescos isto se dá) taes cilios tambem existem, e assim este caracteristico é um tanto problematico.

*Cosmotoma zikani* n. sp.

*C. viridanae* Lacord. affinis, olivaceo-picea, pube argenteo-sericea vestita, setis longissimis et erectis interspersis, elytris fascia nigra pone medium ornatis; caput amplum, inter antenas concavum, fronte transversa, subplana, oculis parvis, minute granulatis, genis elongatis; antennae ♂ corpore sesqui longiores, ♀ apicem elytrorum articulis tribus ultimis superantes, scapo gracili, art. 3 leniter brevior, 4.º praecedente longiore, 5-11 subaequalibus, subtus basi longe fimbriatae, art. 4.º apice crista pilorum subtus ornato; thorax latitudine haud longior, subglobosus, basi fortiter constrictus, dorso valde convexo tuberculisque duobus obsoletis et transversis in medio sitis munitus, lateribus inermibus; scutellum dense argenteo-sericeo tomentosum; elytra thoracis latitudinem maximam fere aequantia, basi recte truncata, postice leniter attenuata, apice ipso sinuato truncato in singulis, angulis externis spinosis, carinis centro basilibus validis, haud fasciculatis, postice haud costata; pedes subaequales, femora pedunculata, fortiter clavata; prosterni processus modice latus, mesosterni processus latus; metasternum sat dense sericeo tomentosum, mesosterni metasternique epimeris necnon abdominis segmenti 1 margine postico albido-pubescentibus.

Long. 8 1/4, 10 mm. 1 ♂, 2 ♀.

Hab. Fazenda Jerusalem, Estado do Espirito Santo, Rio Muriahé, Estado do Rio de Janeiro, Rio José Pedro, Estado de Minas Geraes, J. F. Zikán leg.

Pelos seus caracteristicos principaes, este longicorneo pertence ao genero *Cosmotoma*, mas pela falta completa dos espinhos lateraes do prothorax, etc., se afasta do mesmo.

Pela forma mais parallela, pela falta do espinho em cada lado do prothorax, pela falta dos fasciculos de cábellos e das costas nos elytrões e tambem pelo fasciculo muito reduzido no quarto articulo antenar, esta especie facilmente se distingue de *C. viridana* Lacord.

A faixa transversal nos elytros na ♀ é estreita e opaca, no ♂, porém, ella é bem larga, lustrosa e acompanha tambem a sutura quasi até a ponta.

O celebre autor do utilissimo e excellente *Coleopterorum Catalogus*, parte 74, refere-se duas vezes á especie *sertifer*, de Serville, juntando-a na pagina 334 ao genero *Pogonocherus*, e na pagina 419 ao genero *Cosmotoma*. Ao meu ver, a especie de Serville é uma verdadeira *Cosmotoma* e identica a *C. viridana* Lacord.

*Oxathres sparsus*, n. sp.

Elipticus, fusco-niger, griseo pubescens, setis nigris et longioribus in elytris passim interspersis, punctis numerosis fulvo-fuscis conspersus, punctis elytrorum juxta scutellum ad suturam maculam trigonem versus trientem apicalem fasciam latam ante apicem maculam marginalem formantibus, tarsis albido-flavis; caput griseo-pubescens, fulvo-fusco punctatum, inter antennas concavum, fronte sulcata, genis mediocribus; antennae subtus sparsim ciliatae, fuscae, art. 3-10 basi griseis; thorax griseo tomentosus, dorso punctis 5 basalibus vittisque 4 anticis angustis et flexuosis, postice abbreviatis, alteris duabus utrinque lateribus fulvo-fuscis, spinis lateribus minutissimis ab angulis posticis distantibus; scutellum triangulare, apice rotundatum, cinereum, fulvo marginatum; elytra postice breviter oblique truncata, passim punctata; pedes mediocres, femoribus valde clavatis, griseo-tomentosis, tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis aequales; metasternum cinereo tomentosum, fulvo-fusco conspersum; abdomen nitidum, segmentis lateraliter griseo maculatis.

Feminae stylo modice elongato, segmento ultimo dorsali acuto, carina media longitudinaliter munito, ventrali subtruncato.

Long. 8 mm.

Hab. 1 ex. do Rio Muriahé, Estado do Rio de Janeiro, J. F. Zikán leg.



*Nyssodrys bella*, n. sp.

Oblonga, subdepressa, postice attenuata, rufo-fusca, dense cinereo tomentosa, elytris maculis 8 rufo-fuscis, albido cinctis; caput cinereo tomentosum, fronte plana, longitudinaliter sulcata, genis brevibus, oculis magnis, profunde incisus, subgrosse granulatis, lobis superioribus modice distantibus; antennae elongatissimae, tenues, subtus setis raris breviter obsitae, articulis, — duobus basalibus exceptis, — apice infuscatis; thorax cinereo tomentosus, punctis minutis sat dense cribatus, spinis lateribus acutis, retrorsum curvatis, pone medium sitis; scutellum transversum, apice rotundatum, cinereo tomentosum; elytra cinereo tomentosa, oblonga, subdepressa, postice attenuata, apice ipso sinuato truncato in singulis, angulis externis productis, basi sat dense minute punctata, postice sublaevia, maculis 8 rufo-fuscis ornata, duabus juxta scutellum, rotundatis, duabus minutis ad humeros, duabus pone medium et maioribus, angulatis, nec suturam nec marginem attingentibus, duabus ante apicem et marginalibus; femora quatuor antica clavata, postica gradatim incrassata, his illis longioribus, apicem elytrorum superantia; tarsi postice elongati, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis longiore; prosterni processus modice latus, mesosterni processus latus, planus; corpus subtus dense cinereo tomentosum.

Maris segmento ultimo ventrali emarginato et bispinoso, dorsali sinuato-truncato.

Feminae stylo elongato, segmento ultimo dorsali acuto, ventrali emarginato.

Long. 8-9 mm.

Hab. 1 ex. do parque Jabaquara, perto da Capital do Estado de S. Paulo, 4 ex. de Annaburg, Estado de Santa Catharina.

A punctuação no thorax e nos elytros é finissima, uma punctuação mais grossa, porém, se observa nas manchas redondas e subbasaes, assim como nas post-mediañas.

*Nyssodrys irrorata*, n. sp.

Oblonga, subdepressa, postice attenuata, nigra, vel nigro-picea, cinereo tomentosa, pronoti vittis tribus, elytrorum maculis numerosis, plus minusve confluentibus nigris vel nigro-piceis; caput cinereo tomentosum, fronte sulcata, genis mediocribus, vertice vittis duabus nigris; oculis minute granulatis, lobis superioribus modice distantibus; antennae elongatae, tenues, subtus sparsim ciliatae; thorax cinereo tomentosus, dorsi vittis tribus nigris ornatus, spinis lateribus minutis, prope angulos posticos sitis; scutellum transversum, apice rotundatum, nigro tomentosum; elytra oblonga, subdepressa, postice attenuata, apice ipso sinuato-truncato in singulis, angulis externis vix productis, subtiliter passim punctata; femora quatuor antica clavata, postica gradatim incrassata, his illis longioribus, abdominis segmentum tertium superantia, tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis longiore; prosterni processus angustus, mesosterni processus latus, planus; corpus subtus dense cinereo tomentosum.

Maris segmento ultimo ventrali sinuato-truncato, dorsali truncato.

Feminae stylo elongato, segmento ultimo dorsali attenuato, apice rotundato, ventrali truncato.

Long. 6 1/2-7 1/2 mm.

Hab. Bosque da Saude, perto da Capital do Estado de S. Paulo, colleccionado pelo autor; Passa Quatro, Sul do Estado de Minas Geraes, J. F. Zikán leg.

As manchinhas pretas nos elytros são bastante numerosas, formando estrias longitudinaes e transversaes e, em um exemplar, se juntaram, para formar até uma faixa transversal bem marcada no segundo terço dos elytros.

O processo prosternal nesta especie é bastante estreita, relacionando-se por causa disto, bem como pelos olhos menos volumosos ao genero *Lepturges*, mas, o

estilo da ♀ sobrepassa bem nitidamente o apice dos elytros, característico que me faz juntar esta especie ao genero *Nyssodrys*.

*Atelographus*, n. gen.

Corpus oblongo-ovatum, tomentosum; caput inter antennas concavum, fronte subplana, longitudinaliter sulcata, vertice convexo, sulcato, oculis minute granulatis, valde incis, genis elongatis, lobis superioribus modice distantibus; antennae corpore plus duplo longiores, tenues, subtis setis raris breviter obsitae, scapo valde elongato; thorax usque ad apices spinarum lateralium dilatatus, spinis obtusis, prope angulos posticos situs; elytra elongata, subdepressa, postice attenuata, apice ipso sinuato-truncato in singulis, angulis suturalibus brevissime productis, externis acutis; femora pedunculata, clavata; tarsi postici breves, art. 1.<sup>o</sup>, 2.<sup>o</sup> et 3.<sup>o</sup> simul sumptis aequali; prosterni processus modice latus, mesosterni processus latus.

Maris segmento ultimo ventrali emarginato et bispinoso, dorsali sinuato-truncato.

Feminae stylo modice elongato, segmento ultimo dorsali ad apicem sensim attenuato, apice ipso fortiter emarginato, ventrali semi-circulariter emarginato et bispinoso.

Por causa da formação do ultimo segmento abdominal nos dois sexos, me vi na necessidade, de criar este genero, que pelo resto se aproxima muito da *Nyssodrys* e *Hylettus*.

*Atelographus sexplagiatus*, n. sp.

Olivaceo-fulvus, virescente-cinereo pubescens, elytris utrinque plagis duabus, multangulatis et marginalibus apiceque albido-cinereo ornatis; caput sub pube haud distincte punctatum, fronte subquadrata; antennae subtiliter virescente-cinereo pubescentes; art. 3-11 piceis; tho-

rax dense virescente-cinereo tomentosus, linea media longitudinali laevi; scutellum triangulare, apice rotundatum, virescente-griseo tomentosum; elytra oblonga, subdepressa, basi passim punctata, postice sublaevia, utrinque plagiis tribus albido-cinereis ornata, 1.<sup>a</sup> ante medium, 2.<sup>a</sup> versus trientem apicalem, marginalibus, suturam haud attingentibus, 3.<sup>a</sup> apicali; corpus subtus virescente-cinereo tomentosum.

Long. 8-11 mm.

Hab. Annaburg, Estado de Santa Catharina, C. Schmith leg.

*Hylettus bondari*, n. sp.

Oblongus, subdepressus, postice, attenuatus, niger, griseo flavoque varia; caput griseo tomentosum, fronte plana, longitudinaliter sulcata, genis brevibus, oculis magnis, profunde incisus, grosse granulatis, lobis superioribus fere contiguus, antennae corpore plus duplo longiores, infra basi ciliatae, art. 3-6 basi griseo annulatis; thorax convexus, dorso flavus, vittis tribus nigris lineolam cineream includentibus, lateraliter griseo, nigro flavoque maculatis, spinis lateralibus conicis; scutellum dense flavo tomentosum; elytra oblonga, subdepressa, postice attenuata, apice ipso sinuato-truncato in singulis, angulis productis, basi sat profunde inordinatim punctata, postice sublaevia, nigra maculis vittisque confluentibus cinereis flavisque conspersa, maculis maioribus vel fasciis duabus una basali altera valde angulata pone medium nigris ornata; corpus subtus cinereo tomentosum, sternis abdominisque lateralibus griseo-flavo maculatis.

Maris segmento ultimo ventrali semicirculariter emarginato, dorsali truncato.

Feminae stylo modice elongato, segmento ultimo dorsali acuto, ventrali truncato.

Long. 7-11 mm.



Hab. 3 ex. do Bosque da Saude, perto da Capital do Estado de S. Paulo, colleccionados pelo autor. Encontrado tambem em Mar de Hespanha e Passa Quatro, Estado de Minas Geraes, Rio Itapemirim, Estado de Espirito Santo, J. F. Zikán leg., Joinville, Estado de Santa Catharina, C. Schmith leg.

As manchas pretas e maiores mencionadas na descripção, ás vezes são pouco perspicuas, mas, em certos exemplares, e principalmente as subbasaes, occupam uma area bem grande. Em geral, o tomento flavo predomina nos elytros, e então chega a formar estrias bem compridas. Vi, porém, exemplares tambem, cujos elytros mostravam um tomento mais cinzento de que flavo.

A cicatriz do primeiro articulo antenar é bem pequena, porém nitida. Pela formação do corpo, e, particularmente das pernas, esta especie muito se relaciona ás especies do genero *Nyssodrys*. Assim os femora das pernas posteriores são compridos e gradualmente engrossados, afastando-se dest'arte, bastante das especies mais typicas deste genero.

Tenho ás mãos uma especie de *Parintius*, Amazonas, que corresponde exactamente á descripção de *Nyssodrys porpinqua*, Bates, cujo primeiro articulo antenar está nitidamente cicatricosa. Quem sabe si não se vira forçado a juntar tambem esta especie ao genero *Hylettus*.

O *Coleopterorum Catalogus* pag. 74, nomea 4 especies deste genero, sendo porém o *griseofasciatus* de Serville (pag. 426) relacionado igualmente (pag. 411) ao genero *Antrypanius*. Bates (Ann. Mag. Nat. Hist. XIV, 1864, sep. p. 131) avisa, que a especie de Serville pertence a este genero e é «a common South-Brazilian insect».

Effectivamente, tenho na colleção e em quantidade regular uma especie do Brasil meridional e do Sul, que por causa da cicatriz no primeiro articulo antenar deve ser annexa a *Hylettus*, e que está munida com uma faixa cinzenta. Tão exactamente porém ella não corresponde á descripção de Serville, e por causa disto

actualmente não me é dado decidir sem hesitação, a que genero a especie de Serville deve ser juntada.

*Lycodesmus*, n. gen.

Robustus, tomentosus, caput latum, subretractum, inter antenas valde concavum, fronte transversa, longitudinaliter sulcata; oculi profunde incisi, haud autem bipartiti, subgrosse granulatis, lobis superioribus distantibus, genis elongatis; vertice longitudinaliter sulcato; antenae corpore breviores, 12 articulatae, subgraciles, subtus basi laxae ciliatae, scapo elongato, robusto, obconico, art. 3 scapo triente brevior, 3 et 4 subaequalibus, ceteris descrescentibus, 12.<sup>o</sup> praecedente dimidio brevior; thorax latitudine brevior, antice paulo juxta basim modice constrictus, lateraliter ante medium callo obsoleto utrinque instructis; scutellum validum, apice rotundatum; elytra latitudine vix longiora, margine late explanato, humeris prominulis, rotundatis, supra in dorso antico convexa, ad suturam juxta scutellum dense et erecte penicillata, marginibus a basi ad trientem apicalem dense fortiterque ciliatis; pedes mediocres, femoribus sublinearibus, subcompressis, tibiis mediis extus haud sulcatis, tarsis subbrevibus, unguiculis fassis; coxae anticae obconicae, extus leniter angulatae, processu prosternali angusto separatae; mesosterni processus vix vel non latior, acetabula antica postice clausa, media extus hiantia.

Interessantissimo genero, cujo lugar no systema é um pouco duvidoso. A meu ver se devia incorporal-o ao grupo *Hemilophini*.

*Lycodesmus superbus*, n. sp.

Ater, tomentosus, capite maculis duabus infra lobos inferioribus oculorum, thorace utrinque macula elongata lateraliter, elytris utrinque ante medium marginis macula magna, subrotundata, introrsum ad medium disco con-

tinuata purpureo-rubris; caput subopacum, sparsim punctatum, pube nigra indutum; antennae elytrorum trientem apicalem attingentes, pube nigra leniter vestitae; thorax opacus, dorso nitido et glabro, passim punctatus; scutellum nitidum, longitudinaliter sulcatum; elytra opaca, pone humeros ad medium sensim rotundato-ampliata, dein apicem versus angustata, apice ipso conjunctim vix producto, passim punctata; abdomen griseo-sericeo hirtum, segmento ultimo apice truncato, emarginato.

Long. 18 1/2 mm., lat. max. 12 1/2 mm.

Hab. São Paulo de Olivença, Estado de Amazonas.

Este interessante longicorneo se parece bastante com certas especies do genero *Mesomphalia* respectivamente *Pseudomesomphalia* (*Cassidinae*) e parece que ficou até agora ignorado.

São Paulo, 29 de Novembro de 1926.

J. Metzner